

Nieuwe vindplaatsen van *Hololepta plana* (SULZER) in België en Nederland (Coleoptera : Histeridae)

door

Jan BOSSELAERS


Abstract. New localities for *Hololepta plana* (SULZER) in Belgium and the Netherlands (Coleoptera : Histeridae). *Hololepta plana* (SULZER) has been reported from four new localities in Belgium and one (probably the first) in the Netherlands. The species can no longer be considered rare in Belgium and it seems to be firmly established over most of the country now. The present high death rate among poplar trees may have enabled the beetle to extend its areal rapidly.

Résumé. Nouvelles localités pour *Hololepta plana* (SULZER) en Belgique et aux Pays-Bas (Coleoptera : Histeridae). *Hololepta plana* (SULZER) a été signalée de quatre nouvelles localités en Belgique et une seule (probablement la première) aux Pays-Bas. L'espèce ne peut plus être considérée comme rare en Belgique et elle semble être présente maintenant dans la majorité du territoire. La mortalité élevée de peupliers qui se manifeste aujourd'hui pourrait être une cause de l'extension rapide de l'aire de répartition de ce coléoptère.

In een vorige mededeling meldde ik de eerste vondst van *Hololepta plana* (SULZER) in Belgische Limburg (fig. I,7). De soort was op dat moment voor België uit de literatuur bekend van 6 vindplaatsen in het zuiden van het land (BOSSELAERS, 1984). Inmiddels werden mij uit onze streken verscheidene nieuwe vindplaatsen gerapporteerd, waarvan ik de gegevens in deze bijdrage samenbreng.

VAN STALLE en BOSMANS (in litt., 1984) meldden één dood exemplaar onder populiereschors, gevonden te Welle (bij Aalst) op 17-IV-1976 (fig. I,8). P. POOT (in litt., 1984) deelde mij - zonder datum - een tot hiertoe niet gepubliceerde vondst uit Echt in Zuid-Limburg mee, ook onder populiereschors (fig. I,9). Mogelijk is dit de eerste waarneming in Nederland. W.O. DE PRINS (in litt., 1984) bezorgde mij een opgave van P. SCHOOLMEESTERS over twee vindplaatsen in het Leuvense : Neerijse, 3 en 9-III-1984 en Heverlee, Eigenhovenbos, 8 en 25-III-1984 (fig. I,10). Op beide vindplaatsen werden verscheidene levende exemplaren aangetroffen onder de schors van rechtopstaande of gevelde dode populieren. Volgens SCHOOLMEESTERS is *H. plana* in de Dijlevallei vrij algemeen geworden als gevolg van het massaal afsterven van populieren in de streek. Tijdens een terreinexcursie te Heverlee (29-III-1984) kon ik dit bevestigd zien : na nauwelijks een kwartier zoeken trof ik al drie exemplaren aan onder de schors van een gevelde populier. Ten slotte bereikte mij kortgeleden een opgave van E. JELASSICS (in litt., 1985), die de soort in grote aantallen aantrof onder de schors van dode populieren te Hoeselt op 12-III-1985 (fig. I,11).

Deze gegevens zullen ongetwijfeld nog kunnen aangevuld worden met vele andere recente vondsten in ons land. *H. plana* kan daarom volgens mij niet langer beschouwd worden als zeldzaam in België. De soort heeft blijkbaar haar areaal de laatste jaren snel uitgebreid en komt nu over vrijwel heel het land verspreid voor. Alleen in de Noorderkempen kon ik tot nu toe geen vindplaatsen lokaliseren. De huidige grote sterfte onder populieren, waarvan de



Figuur 1 : Vindplaatsen van *H. plana* (SULZER) in België en Nederland (UTM-rooster).
Verklaring in de tekst.

Distribution of *H. plana* (SULZER) in Belgium and the Netherlands (UTM-grid).
Further explanation in text.

reden mij onbekend is, zal deze opvallende opmars van *H. plana* zeker in de hand gewerkt hebben.

Literatuur

Bosselaers, J., 1984. *Hololepta plana* (SULZER) in the north-east of Belgium (Coleoptera : Histeridae). *Phegea* 12 : 51-54.

Bosselaers J. : Stichting Limburgs Landschap, Korenbloemstraat 10, B-2340 Beerse.